

Câu 1. Cho hình tứ diện $OABC$ có đáy OBC là tam giác vuông tại O , $OB = a$, $OC = a\sqrt{3}$. Cạnh OA vuông góc với mặt phẳng (OBC) , $OA = a\sqrt{3}$, gọi M là trung điểm của BC . Tính theo a khoảng cách h giữa hai đường thẳng AB và OM .

- A.** $h = \frac{a\sqrt{5}}{5}$. **B.** $h = \frac{a\sqrt{15}}{5}$. **C.** $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. **D.** $h = \frac{a\sqrt{3}}{15}$.

Câu 2. Phương trình $2\cos x - 1 = 0$ có nghiệm là

- A.** $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{1-x}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A.** Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại đỉnh A , cạnh $BC = a$, $AC = \frac{a\sqrt{6}}{3}$, các cạnh bên $SA = SB = SC = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Tính góc tạo bởi mặt bên (SAB) và mặt phẳng đáy (ABC) .

- A.** $\frac{\pi}{6}$. **B.** $\frac{\pi}{3}$. **C.** $\frac{\pi}{4}$. **D.** $\arctan 3$.

Câu 5. Tính đạo hàm của hàm số $y = \sin 2x + 3^x$.

- A.** $y' = 2\cos 2x + x^{3^x} - 1$. **B.** $y' = -\cos 2x + 3^x$.
C. $y' = -2\cos 2x - 3^x \ln 3$. **D.** $y' = 2\cos 2x + 3^x \ln 3$.

Câu 6. Cho các số thực $a < b < 0$. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

- A.** $\ln\left(\frac{a}{b}\right)^2 = \ln(a^2) - \ln(b^2)$. **B.** $\ln(ab)^2 = \ln(a^2) + \ln(b^2)$.
C. $\ln\sqrt{ab} = \frac{1}{2}(\ln a + \ln b)$. **D.** $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln|a| - \ln|b|$.

Câu 7. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính cosin góc giữa hai đường thẳng AB và CI với I là trung điểm của AD .

- A.** $\frac{\sqrt{3}}{6}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{4}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 8. Cho số thực a thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a\sqrt{2x^2+3} + 2017}{2x + 2018} = \frac{1}{2}$. Khi đó giá trị của a là

- A.** $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $a = \frac{-\sqrt{2}}{2}$. **C.** $a = \frac{1}{2}$. **D.** $a = \frac{-1}{2}$.


Câu 9. Phương trình $\log_2(x - 3) + \log_2(x - 1) = 3$ có nghiệm là một số

- A.** chẵn. **B.** chia hết cho 3. **C.** chia hết cho 7. **D.** chia hết cho 5.

Câu 10. Tập xác định của hàm số $y = (2 - x)^{\sqrt{3}}$ là

- A.** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. **B.** $\mathcal{D} = (2; +\infty)$. **C.** $\mathcal{D} = (-\infty; 2)$. **D.** $\mathcal{D} = (-\infty; 2]$.

Câu 11. Đồ thị (hình dưới) là đồ thị của hàm số nào?



- A.** $y = \log_2 x + 1$. **B.** $y = \log_2(x + 1)$. **C.** $y = \log_3 x$. **D.** $y = \log_2(x + 1)$.

Câu 12. Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a là

- A.** $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. **B.** $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. **D.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 13. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = 2x^3 + 3x^2$ tại điểm M có tung độ bằng 5 có phương trình là

- A.** $y = -12x - 7$. **B.** $y = 12x - 7$. **C.** $y = -12x + 17$. **D.** $y = 12x + 17$.

Câu 14. Một hình trụ có bán kính đáy a , có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính theo a diện tích xung quanh của hình trụ.

- A.** πa^2 . **B.** $2\pi a^2$. **C.** $3\pi a^2$. **D.** $4\pi a^2$.


Câu 15. Đồ thị hàm số $y = \frac{-3x + 1}{x + 2}$ có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là

- A.** $x = 2$ và $y = 1$. **B.** $x = -2$ và $y = 1$.
C. $x = -2$ và $y = -3$. **D.** $x = -2$ và $y = 3$.

Câu 16. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $M_0(1; 0)$ là

- A.** $y = -3x + 3$. **B.** $y = -3x + 1$. **C.** $y = 3x + 1$. **D.** $y = 3x + 3$.

Câu 17. Đồ thị (hình dưới) là đồ thị của hàm số nào?



- A. $y = \frac{x+2}{x+1}$. B. $y = \frac{2x+1}{x+1}$. C. $y = \frac{x-1}{x+1}$. D. $y = \frac{x+3}{1-x}$.

Câu 18. Tính theo a bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều $S.ABC$, biết các cạnh đáy có độ dài bằng a , cạnh bên $SA = a\sqrt{3}$.

- A. $\frac{3a\sqrt{6}}{8}$. B. $\frac{3a\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$. C. $\frac{2a\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{8}$.

Câu 19. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- A. $\log_3 5 > 0$. B. $\log_{2+x^2} 2016 < \log_{2+x^2} 2017$.
C. $\log_{0,3} 0,8 < 0$. D. $\log_3 4 > \log_4 \left(\frac{1}{3}\right)$.


Câu 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách h từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) .

- A. $h = \frac{a\sqrt{21}}{7}$. B. $h = a$. C. $h = \frac{a\sqrt{3}}{4}$. D. $h = \frac{a\sqrt{3}}{7}$.

Câu 21. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Hỏi hàm số đó luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi nào?

- A. $\begin{cases} a = b = 0, c > 0 \\ a < 0; b^2 - 3ac \leq 0 \end{cases}$. B. $\begin{cases} a = b = 0, c > 0 \\ a > 0; b^2 - 3ac \leq 0 \end{cases}$.
C. $\begin{cases} a = b = c = 0 \\ a < 0; b^2 - 3ac < 0 \end{cases}$. D. $\begin{cases} a = b = 0, c > 0 \\ a > 0; b^2 - 3ac \geq 0 \end{cases}$.

Câu 22. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như bảng dưới đây:

x	$-\infty$	2	4	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$				$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** Hàm số đạt cực đại tại $x = 3$. **B.** Hàm số đạt cực đại tại $x = 4$.
C. Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$. **D.** Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$.

Câu 23. Đồ thị của hàm số nào sau đây có đúng ba đường tiệm cận?

- A.** $y = \frac{x}{x^2 - x + 9}$. **B.** $y = \frac{1 - 2x}{1 + x}$. **C.** $y = \frac{1}{4 - x^2}$. **D.** $y = \frac{x + 3}{5x - 1}$.

Câu 24. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x - 1}{x + 1}$ trên đoạn $[0; 3]$ là

- A.** $\min_{[0;3]} y = \frac{1}{2}$. **B.** $\min_{[0;3]} y = -3$. **C.** $\min_{[0;3]} y = 1$. **D.** $\min_{[0;3]} y = -1$.

Câu 25. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt đáy, tam giác ABC vuông tại A , $SA = 2\text{cm}$, $AB = 4\text{cm}$, $AC = 3\text{cm}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

- A.** 4cm^3 . **B.** 6cm^3 . **C.** 8cm^3 . **D.** 24cm^3 .

Câu 26. Cho hàm số $f(x) = x^3 + 3x + m$ với $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên $[0; 1]$ bằng 4.

- A.** $m = 4$. **B.** $m = -1$. **C.** $m = 0$. **D.** $m = 8$.

Câu 27. Đường thẳng $y = x - 1$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$ tại các điểm có tọa độ là

- A.** $(0; -1)$ và $(2; 1)$. **B.** $(0; 2)$. **C.** $(1; 2)$. **D.** $(-1; 0)$ và $(2; 1)$.

Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm phương trình đường thẳng Δ' là ảnh của đường thẳng $\Delta : x + 2y - 1 = 0$ qua phép tịnh tiến theo véc-tơ $\vec{v} = (1; -1)$.

- A.** $\Delta' : x + 2y - 3 = 0$. **B.** $\Delta' : x + 2y = 0$.
C. $\Delta' : x + 2y + 1 = 0$. **D.** $\Delta' : x + 2y + 2 = 0$.

Câu 29. Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn có ít nhất một người nữ.

- A.** $\frac{2}{15}$. **B.** $\frac{7}{15}$. **C.** $\frac{8}{15}$. **D.** $\frac{1}{15}$.

Câu 30. Cho hình nón tròn xoay có đỉnh là S , O là tâm của đường tròn đáy, đường sinh bằng $a\sqrt{2}$ và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 60° . Tính diện tích xung quanh S_{xq} của hình nón và thể tích V của khối nón.

A. $S_{xq} = \pi a^2, V = \frac{\pi a^3 \sqrt{6}}{12}$.

B. $S_{xq} = \frac{\pi a^2}{2}, V = \frac{\pi a^3 \sqrt{6}}{12}$.

C. $S_{xq} = \pi a^2 \sqrt{2}, V = \frac{\pi a^3 \sqrt{6}}{4}$.

D. $S_{xq} = \pi a^2, V = \frac{\pi a^3 \sqrt{6}}{4}$.

Câu 31. Tính diện tích bề mặt của khinh khí cầu, biết rằng khinh khí cầu là một hình cầu có đường kính 11m (lấy $\pi \simeq \frac{22}{7}$ và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).





A. 380,29m².

B. 697,19m².

C. 190,14m².

D. 95,07m².

Câu 32. Hình nào dưới đây **không** phải là hình đa diện?



Câu 33. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B . Biết SAB là tam giác đều và thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Tính theo a thể tích khối chóp $S.ABC$ biết $AB = a, AC = a\sqrt{3}$.

A. $\frac{a^3 \sqrt{2}}{6}$.

B. $\frac{a^3}{4}$.

C. $\frac{a^3 \sqrt{6}}{4}$.

D. $\frac{a^3 \sqrt{6}}{12}$.

Câu 34. Gọi a là một nghiệm của phương trình $4 \cdot 2^{2 \log x} - 6^{\log x} - 18 \cdot 3^{2 \log x} = 0$. Khẳng định nào sau đây là đúng khi đánh giá về a .

A. $(a - 10)^2 = 1$.

B. a cũng là nghiệm của phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{\log x} = \frac{9}{4}$.

C. $a^2 + a + 1 = 2$.

D. $a = 10^2$.

Câu 35. Hàm số $y = -x^4 + 2mx^2 + 1$ đạt cực tiểu tại $x = 0$ khi

A. $-1 \leq m < 0$.

B. $m \geq 0$.

C. $m < -1$.

D. $m > 0$.

Câu 36. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $3^x + 9 \cdot 3^{-x} < 10$ là

A. Vô số.

B. 2.

C. 0.

D. 1.

Câu 37. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, tam giác ABC cân tại A . Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho $AB = 3AD$. Gọi H là hình chiếu của B trên CD , M là trung điểm của đoạn thẳng CH . Tính theo a thể tích khối chóp $S.ABM$ biết $SA = AM = a$ và $BM = \frac{2}{3}a$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{9}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. C. $\frac{a^3}{9}$. D. $\frac{a^3}{18}$.

Câu 38. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x^2-2mx+4}$ có đồ thị là (C) . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị (C) có đúng 3 đường tiệm cận.

- A. $\begin{cases} m < -2 \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}$. B. $m > 2$.
C. $\begin{cases} m \neq -\frac{5}{2} \\ m > 2 \vee m < -2 \end{cases}$. D. $m > 2 \vee m < -2$.

Câu 39. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình $2\sqrt{x+1} = x + m$ có nghiệm thực.

- A. $m \leq 3$. B. $m \leq 2$. C. $m \geq 3$. D. $m \geq 2$.

Câu 40. Cho hàm số $y = f(x) = \ln(2e^x + m)$ có $f'(-\ln 2) = \frac{3}{2}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $m \in (1; 3)$. B. $m \in (-5; -2)$. C. $m \in (1; +\infty)$. D. $m \in (-\infty; 3)$.

Câu 41. Cho biểu thức $f(x) = \frac{1}{2018^x + \sqrt{2018}}$. Tính tổng sau

$$S = \sqrt{2018} [f(-2017) + f(-2016) + \cdots + f(0) + f(1) + \cdots + f(2018)]$$

- A. $S = \sqrt{2018}$. B. $S = \frac{1}{2018}$. C. $S = 2018$. D. $S = \frac{1}{\sqrt{2018}}$.

Câu 42. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng $y = 4m$ cắt đồ thị hàm số $y = x^4 - 8x^2 + 3$ tại bốn điểm phân biệt.

- A. $-\frac{13}{4} < m < \frac{3}{4}$. B. $-\frac{13}{4} \leq m \leq \frac{3}{4}$. C. $m \leq \frac{3}{4}$. D. $m \geq -\frac{13}{4}$.

Câu 43. Cho phương trình $\log_2(x - \sqrt{x^2 - 1}) \cdot \log_3(x + \sqrt{x^2 - 1}) = \log_6|x - \sqrt{x^2 - 1}|$. Biết phương trình có một nghiệm là 1 và một nghiệm còn lại có dạng $x = \frac{1}{2}(a^{\log_b c} + a^{-\log_b c})$ (với a, c là các số nguyên tố và $a > c$). Giá trị của $a^2 - 2b + 3c$ là

- A. 0. B. 3. C. 6. D. 4.

Câu 44. Nghiệm của phương trình $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 1$ là

- A. $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \vee x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = \frac{5\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 45. Cho đa giác đều $A_1A_2A_3 \dots A_{30}$ nội tiếp trong đường tròn (O) . Tính số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 30 đỉnh của đa giác đó.

- A. 105. B. 27405. C. 27406. D. 106.

Câu 46. Tính


$$S = C_{2017}^1 - 2^2 C_{2017}^2 + 3 \cdot 2^2 C_{2017}^3 - 4 \cdot 2^3 C_{2017}^4 + \dots - 2016 \cdot 2^{2015} C_{2017}^{2016} + 2017 \cdot 2^{2016} C_{2017}^{2017}.$$

- A.** $S = -2017$. **B.** $S = -2016$. **C.** $S = 2017$. **D.** $S = 2016$.

Câu 47.


Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 - 3)$.

- A.** 4. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 3.



Câu 48. Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50cm x 240cm, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50cm, theo hai cách như sau:

- Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng



- Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng



Kí hiệu V_1 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và V_2 là tổng thể tích của hai thùng gò được theo cách 2. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$.

- A.** $\frac{V_1}{V_2} = 1$. **B.** $\frac{V_1}{V_2} = 2$. **C.** $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{2}$. **D.** $\frac{V_1}{V_2} = 4$.

Câu 49. Bất phương trình $\log_4(x + 7) > \log_2(x + 1)$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 50. Cho x, y là hai số thực dương thay đổi thỏa mãn điều kiện $(xy + 1)(\sqrt{xy + 1} - \sqrt{y}) \leq 1 - x - \frac{1}{y}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{x + y}{\sqrt{x^2 - xy + 3y^2}} - \frac{x - 2y}{6(x + y)}$.

- A.** $\frac{\sqrt{5}}{3} - \frac{7}{30}$. **B.** $\frac{7}{30} - \frac{\sqrt{5}}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{5}}{3} + \frac{7}{30}$. **D.** $\frac{\sqrt{5+7}}{30}$.