


Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng $f(x)$ là một trong bốn hàm số được đưa ra trong các phương án A, B, C, D dưới đây. Tìm $f(x)$.

- A. $f(x) = e^x$. B. $f(x) = \left(\frac{3}{\pi}\right)^x$.
C. $f(x) = \ln x$. D. $f(x) = x^{\frac{e}{\pi}}$.



Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, đồng biến trên đoạn $[a; b]$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(a; b)$.
B. Hàm số đã cho có cực trị trên đoạn $[a; b]$.
C. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[a; b]$.
D. Phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm duy nhất thuộc đoạn $[a; b]$.

Câu 3: Cho tích phân $I = \int_0^{\pi} x^2 \cos x \, dx$ và $u = x^2$, $dv = \cos x \, dx$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $I = x^2 \sin x \Big|_0^{\pi} - 2 \int_0^{\pi} x \sin x \, dx$. B. $I = x^2 \sin x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} x \sin x \, dx$.
C. $I = x^2 \sin x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} x \sin x \, dx$. D. $I = x^2 \sin x \Big|_0^{\pi} + 2 \int_0^{\pi} x \sin x \, dx$.

Câu 4: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số có hai điểm cực trị.
B. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.
C. Hàm số có một điểm cực trị.
D. Giá trị lớn nhất của hàm số là 3.


x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	-		+	-
y	$+\infty$	-1	3	$-\infty$

Câu 5: Đạo hàm của hàm số $y = \log_2(e^x + 1)$ là


- A. $y' = \frac{e^x}{(e^x + 1) \ln 2}$. B. $y' = \frac{2^x \ln 2}{2^x + 1}$. C. $y' = \frac{2^x}{(2^x + 1) \ln 2}$. D. $y' = \frac{e^x \ln 2}{e^x + 1}$.

Câu 6: Gọi M và N lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức z_1, z_2 như hình vẽ bên. Khi đó khẳng định nào sau đây sai?

- A. $|z_1 - z_2| = MN$. B. $|z_1| = OM$.
C. $|z_2| = ON$. D. $|z_1 + z_2| = MN$.



Câu 7: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



- A. Hàm số có hai điểm cực đại là $x = -1, x = 2$.
- B. Hàm số có hai điểm cực tiểu là $x = 0, x = 3$.
- C. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$, cực đại tại $x = 2$.
- D. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$, cực đại tại $x = -1$.

Câu 8: Số giao điểm của đồ thị hai hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ và $y = x^2 - x - 1$ là

- A. 3.
- B. 1.
- C. 0.
- D. 2.

Câu 9: Cho hai số thực dương x, y bất kỳ. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\log_2 \frac{x^2}{y} = \frac{2 \log_2 x}{\log_2 y}$.
- B. $\log_2(x^2 y) = 2 \log_2 x + \log_2 y$.
- C. $\log_2(x^2 + y) = 2 \log_2 x \cdot \log_2 y$.
- D. $\log_2(x^2 y) = \log_2 x + 2 \log_2 y$.

Câu 10: Trong một hình đa diện lồi, mỗi cạnh là cạnh chung của tất cả bao nhiêu mặt?

- A. 5.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 2.

Câu 11: Cho z là một số phức tùy ý khác 0. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\frac{z}{\bar{z}}$ là số ảo.
- B. $z - \bar{z}$ là số ảo.
- C. $z \cdot \bar{z}$ là số thực.
- D. $z + \bar{z}$ là số thực.

Câu 12: Tập xác định của hàm số $y = (1 - 2x)^{\frac{1}{3}}$ là

- A. $\mathbb{R}$.
- B. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$.
- C. $(0; +\infty)$.
- D. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$.

Câu 13: Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2 - 3$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên $(0; +\infty)$.
- B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$.
- C. Hàm số nghịch biến trên $(-1; 1)$.
- D. Hàm số đồng biến trên $(-1; 0)$.

Câu 14: Tìm m để hàm số $y = x^3 + 2x^2 - mx + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. $m < -\frac{4}{3}$.
- B. $m \leq -\frac{4}{3}$.
- C. $m \geq -\frac{4}{3}$.
- D. $m > -\frac{4}{3}$.

Câu 15: Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| + C$.
- B. $\int \cot x \, dx = -\ln |\sin x| + C$.
- C. $\int \sin \frac{x}{2} \, dx = 2 \cos \frac{x}{2} + C$.
- D. $\int \cos \frac{x}{2} \, dx = -2 \sin \frac{x}{2} + C$.

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm $A(2; -3; 1)$ lên Δ .

- A. $H(-3; -1; -2)$.
- B. $H(-1; -2; 0)$.
- C. $H(3; -4; 4)$.
- D. $H(1; -3; 2)$.

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x + ay + 3z - 5 = 0$ và $(Q): 4x - y - (a+4)z + 1 = 0$. Tìm a để (P) và (Q) vuông góc với nhau.

- A. $a = 1$.
- B. $a = 0$.
- C. $a = -1$.
- D. $a = \frac{1}{3}$.

Câu 18: Cho biểu thức $P = \sqrt{x^4 \cdot \sqrt[3]{x}}$ với x là số dương khác 1. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $P = \sqrt[6]{x^{13}}$. B. $P = x^{\frac{13}{6}}$. C. $P = x\sqrt{x^2 \cdot \sqrt[3]{x}}$. D. $P = x^2 \cdot \sqrt[3]{x}$.

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 2y + z + 6 = 0$. Tìm tọa độ điểm M thuộc tia Oz sao cho khoảng cách từ M đến (P) bằng 3.

- A. $M(0; 0; 21)$. B. $M(0; 0; 3)$.
C. $M(0; 0; 3), M(0; 0; -15)$. D. $M(0; 0; -15)$.

Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2my + 6z + 13 = 0$ là phương trình của mặt cầu.

- A. $m > 0$. B. $m \neq 0$. C. $m \in \mathbb{R}$. D. $m < 0$.

Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{1}$ và

$$d_2: \begin{cases} x = 1 + kt \\ y = t \\ z = -1 + 2t \end{cases}. \text{ Tìm giá trị của } k \text{ để } d_1 \text{ cắt } d_2.$$

- A. $k = 0$. B. $k = 1$. C. $k = -1$. D. $k = -\frac{1}{2}$.

Câu 22: Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = (x+1)e^x$ và $\int f(x)dx = (ax+b)e^x + c$, với a, b, c là các hằng số. Khi đó

- A. $a+b=0$. B. $a+b=3$. C. $a+b=2$. D. $a+b=1$.

Câu 23: Tập xác định của hàm số $y = \ln(1 - \sqrt{x+1})$ là

- A. $[-1; 0]$. B. $[-1; +\infty)$. C. $(-1; 0)$. D. $[-1; 0)$.

Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $M(-1; 1; 2), N(1; 4; 3), P(5; 10; 5)$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. M, N, P là ba đỉnh của một tam giác.
B. $MN = \sqrt{14}$.
C. Trung điểm của NP là $I(3; 7; 4)$.
D. Các điểm O, M, N, P cùng thuộc một mặt phẳng.

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-4)^2 = 10$ và mặt phẳng $(P): -2x + y + \sqrt{5}z + 9 = 0$. Gọi (Q) là tiếp diện của (S) tại $M(5; 0; 4)$. Tính góc giữa (P) và (Q) .

- A. 60° . B. 120° . C. 30° . D. 45° .

Câu 26: Nghiệm của bất phương trình $\log_2(x+1) + \log_{\frac{1}{2}}\sqrt{x+1} \leq 0$ là

- A. $-1 < x \leq 0$. B. $-1 \leq x \leq 0$. C. $-1 < x \leq 1$. D. $x \leq 0$.

Câu 27: Biết rằng phương trình $z^2 + bz + c = 0$ ($b, c \in \mathbb{R}$) có một nghiệm phức là $z_1 = 1 + 2i$. Khi đó

- A. $b+c=2$. B. $b+c=3$. C. $b+c=0$. D. $b+c=7$.

Câu 28: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \ln(x^2 - 2x + 1) - x$ trên đoạn $[2; 4]$ là

- A. $2\ln 2 - 3$. B. $2\ln 3 - 4$. C. -2 . D. -3 .

Câu 29: Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{2-x}$, $y = x$, $y = 0$ xung quanh trục Ox được tính theo công thức nào sau đây?

A. $V = \pi \int_0^1 (2-x)dx + \pi \int_1^2 x^2 dx.$

B. $V = \pi \int_0^2 (2-x)dx.$

C. $V = \pi \int_0^1 x dx + \pi \int_1^2 \sqrt{2-x} dx.$

D. $V = \pi \int_0^1 x^2 dx + \pi \int_1^2 (2-x)dx.$

Câu 30: Cho các số phức $z_1 = 1 - 2i$, $z_2 = 2 - 3i$. Khẳng định nào sau đây là **sai** về số phức $w = z_1 \cdot \bar{z}_2$?

A. Môđun của w là $\sqrt{65}$.

B. Số phức liên hợp của w là $8 + i$.

C. Điểm biểu diễn w là $M(8; 1)$.

D. Phần thực của w là 8, phần ảo là -1 .

Câu 31: Cho $I = \int_1^2 x\sqrt{4-x^2} dx$ và $t = \sqrt{4-x^2}$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $I = \sqrt{3}.$

B. $I = \frac{t^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{3}}$

C. $I = \int_0^{\sqrt{3}} t^2 dt.$

D. $I = \frac{t^3}{3} \Big|_0^{\sqrt{3}}$


Câu 32: Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a > 0$, $b < 0$, $c < 0$.

B. $a < 0$, $b > 0$, $c > 0$.

C. $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$.

D. $a > 0$, $b < 0$, $c > 0$.



Câu 33: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AA' = a\sqrt{3}$. Gọi I là giao điểm của AB' và $A'B$. Cho biết khoảng cách từ I đến mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

A. $3a^3.$

B. $a^3.$

C. $\frac{3a^3}{4}.$

D. $\frac{a^3}{4}.$

Câu 34: Cho hình nón đỉnh S . Xét hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác ngoại tiếp đường tròn đáy của hình nón và có $AB = BC = 10a$, $AC = 12a$, góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng 45° . Tính thể tích khối nón đã cho.

A. $9\pi a^3.$

B. $27\pi a^3.$

C. $3\pi a^3.$

D. $12\pi a^3.$

Câu 35: Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \sqrt{4-x^2}$. Khi đó

A. $M - m = 2\sqrt{2} - 2.$

B. $M - m = 4.$

C. $M - m = 2\sqrt{2} + 2.$

D. $M - m = 2\sqrt{2}.$

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{-2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{1}$ và hai điểm $A(-1; 3; 1)$, $B(0; 2; -1)$. Tìm tọa độ điểm C thuộc d sao cho diện tích của tam giác ABC bằng $2\sqrt{2}$.

A. $C(-1; 0; 2).$

B. $C(1; 1; 1).$

C. $(-3; -1; 3).$

D. $C(-5; -2; 4).$

Câu 37: Tất cả các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x - \sqrt{x^2 - 4}}{x^2 - 4x + 3}$ là

A. $y = 1$ và $x = 3.$

B. $y = 0$, $y = 1$ và $x = 3.$

C. $y = 0$, $x = 1$ và $x = 3.$


D. $y = 0$ và $x = 3.$

Câu 38: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, mặt bên SAD là tam giác đều cạnh $2a$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ biết rằng mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng đáy một góc 30° .

- A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{2}$. B. $2\sqrt{3}a^3$. C. $\frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. D. $\frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 39: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tất cả các giá trị của m để phương trình $|f(x)| = m$ có 2 nghiệm phân biệt là


- A. $m \geq 2$ và $m \leq 1$.
B. $0 < m < 1$ và $m > 1$.
C. $m > 2$ và $m < 1$.
D. $0 < m < 1$.



Câu 40: Cho hàm số $y = \log_2 x$. Khẳng định nào sau đây **sai**?


- A. Tập xác định của hàm số là $(0; +\infty)$.
B. Đồ thị của hàm số cắt đường thẳng $y = x$.
C. Tập giá trị của hàm số là $(-\infty; +\infty)$.
D. Đồ thị của hàm số cắt đường thẳng $y = x - 1$ tại hai điểm phân biệt.

Câu 41: Ông B có một khu vườn giới hạn bởi một đường parabol và một đường thẳng. Nếu đặt trong hệ tọa độ Oxy như hình vẽ bên thì parabol có phương trình $y = x^2$ và đường thẳng là $y = 25$. Ông B dự định dùng một mảnh vườn nhỏ được chia từ khu vườn bởi một đường thẳng đi qua O và điểm M trên parabol để trồng một loại hoa. Hãy giúp ông B xác định điểm M bằng cách tính độ dài OM để diện tích mảnh vườn nhỏ bằng $\frac{9}{2}$.



- A. $OM = 2\sqrt{5}$. B. $OM = 15$. C. $OM = 10$. D. $OM = 3\sqrt{10}$.

Câu 42: Một người thợ có một khối đá hình trụ. Kẻ hai đường kính MN , PQ của hai đáy sao cho $MN \perp PQ$. Người thợ đó cắt khối đá theo các mặt cắt đi qua 3 trong 4 điểm M , N , P , Q để thu được khối đá có hình tứ diện $MNPQ$. Biết rằng $MN = 60$ cm và thể tích khối tứ diện $MNPQ$ bằng 30 dm^3 . Hãy tìm thể tích của lượng đá bị cắt bỏ (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân).



- A. $101,3 \text{ dm}^3$. B. $141,3 \text{ dm}^3$. C. $121,3 \text{ dm}^3$. D. $111,4 \text{ dm}^3$.

Câu 43: Cho số phức z thay đổi luôn có $|z| = 2$. Khi đó tập hợp điểm biểu diễn số phức $w = (1 - 2i)\bar{z} + 3i$ là

A. Đường tròn $x^2 + (y - 3)^2 = 20$.

B. Đường tròn $x^2 + (y - 3)^2 = 2\sqrt{5}$.

C. Đường tròn $x^2 + (y + 3)^2 = 20$.

D. Đường tròn $(x - 3)^2 + y^2 = 2\sqrt{5}$.

Câu 44: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SC = 2a$ và $SC \perp (ABC)$. Đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và có $AB = a\sqrt{2}$. Mặt phẳng (α) đi qua C và vuông góc với SA , (α) cắt SA , SB lần lượt tại D , E . Tính thể tích khối chóp $S.CDE$.

A. $\frac{4a^3}{9}$.

B. $\frac{2a^3}{3}$.

C. $\frac{2a^3}{9}$.

D. $\frac{a^3}{3}$.

Câu 45: Cho các số phức z , w khác 0 và thỏa mãn $|z - w| = 2|z| = |w|$. Phần thực của số phức $u = \frac{z}{w}$ là

A. $a = \frac{1}{4}$.

B. $a = 1$.

C. $a = \frac{1}{8}$.

D. $a = -\frac{1}{8}$.

Câu 46: Cho các số thực x , y thỏa mãn $x^2 + 2xy + 3y^2 = 4$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = (x - y)^2$ là



A. $\max P = 8$.

B. $\max P = 4$.

C. $\max P = 12$.

D. $\max P = 16$.

Câu 47: Bạn A có một cốc thủy tinh hình trụ, đường kính trong lòng đáy cốc là 6 cm, chiều cao trong lòng cốc là 10 cm đang đựng một lượng nước. Bạn A nghiêng cốc nước, vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy. Tính thể tích lượng nước trong cốc.



A. 60 cm^3 .

B. $15\pi \text{ cm}^3$.

C. 70 cm^3 .

D. $60\pi \text{ cm}^3$.

Câu 48: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = 4a$, $CD = 6a$, các cạnh còn lại đều bằng $a\sqrt{22}$. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

A. $\frac{5a}{2}$.

B. $3a$.

C. $\frac{a\sqrt{85}}{3}$.

D. $\frac{a\sqrt{79}}{3}$.

Câu 49: Tất cả các giá trị của m để phương trình $e^x = m(x + 1)$ có nghiệm duy nhất là

A. $m > 1$.

B. $m < 0, m \geq 1$.

C. $m < 0, m = 1$.

D. $m < 1$.

Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -3)$ và mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 9 = 0$.

Đường thẳng d đi qua A và có vectơ chỉ phương $\vec{u}(3; 4; -4)$ cắt (P) tại B . Điểm M thay đổi trong (P) sao cho M luôn nhìn đoạn AB dưới góc 90° . Khi độ dài MB lớn nhất, đường thẳng MB đi qua điểm nào trong các điểm sau?

A. $H(-2; -1; 3)$.

B. $I(-1; -2; 3)$.

C. $K(3; 0; 15)$.

D. $J(-3; 2; 7)$.

----- HẾT -----