

(Đề thi có 40 câu / 7 trang)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Kim loại xesi dùng để chế tạo tế bào quang điện .
- B. Thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng .
- C. Công thức hóa học của phèn chua là $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$.
- D. Các kim loại Na và Ba đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối.

Câu 2: Cho mẫu nước cứng có chứa các ion: Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , SO_4^{2-} . Hóa chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

- A. Na_3PO_4
- B. AgNO_3
- C. BaCl_2
- D. NaCl

Câu 3: Este $\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_3$ không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

- A. Dung dịch NaOH , đun nóng.
- B. H_2 (xúc tác Ni , đun nóng).
- C. Kim loại Na .
- D. H_2O (xúc tác H_2SO_4 loãng, đun nóng).

Câu 4: Thực hiện các thí nghiệm sau:

- (1) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO_4 .
- (2) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO_3 loãng, nguội
- (3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl_2
- (4) Cho lá hợp kim Fe-Cu vào dung dịch H_2SO_4 loãng

Số thí nghiệm mà kim loại bị ăn mòn hóa học là

- A. 1
- B. 4
- C. 3
- D. 2

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai là

- A. Tinh bột là lương thực của con người
- B. Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành thì có kết tủa xuất hiện.
- C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.
- D. Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ

Câu 6: Cho 4,05 gam bột Al tác dụng với V lít O_2 (đktc), thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra 1,68 lít H_2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

- A. 3,36 B. 1,26 C. 1,68 D. 6,72

Câu 7: Số đồng phân cấu tạo là tetrapeptit có cùng công thức phân tử $C_9H_{16}O_5N_4$ là

- A. 2 B. 1 C. 3 D. 4

Câu 8: Metylamin không phản ứng với

- A. dung dịch H_2SO_4 B. H_2 (xúc tác Ni, nung nóng)
C. dung dịch HCl D. O_2 , nung nóng

Câu 9: Este nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CH_3COONa và CH_3CHO

- A. $CH_2=CHCOOCH_3$ B. $CH_3COOCH=CH_2$
C. $HCOOCH=CH_2$ D. $CH_3COOCH=CHCH_3$

Câu 10: Khi thủy phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phẩm gồm glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

- A. 6 B. 8 C. 2 D. 4

Câu 11: Thành phần chính của đá vôi là

- A. $CaCO_3$ B. $BaCO_3$ C. $MgCO_3$ D. $FeCO_3$

Câu 12: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch $CuSO_4$?

- A. Al B. Ag C. Fe D. Zn

Câu 13: Cho 9 gam $C_2H_5NH_2$ tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là

- A. 16,30 gam B. 16,10 gam C. 12,63 gam D. 12,65 gam

Câu 14: Phần trăm khối lượng của nguyên tố cacbon trong phân tử anilin ($C_6H_5NH_2$) là

- A. 83,72 % B. 75,00 % C. 78,26% D. 77,42%

Câu 15: Công thức phân tử của tristearin là

- A. $C_{57}H_{104}O_6$ B. $C_{54}H_{104}O_6$ C. $C_{54}H_{98}O_6$ D. $C_{57}H_{110}O_6$

Câu 16: Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc I có cùng công thức phân tử C_3H_9N là

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 17: Cho dãy các kim loại: Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Ba. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

- A. 5 B. 4 C. 6 D. 3

Câu 18: Cho m gam kim loại Ba và nước dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít H₂ (đktc). Giá trị của m là

- A. 13,70. B. 27,40. C. 54,80. D. 20,55.

Câu 19: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

- A. policacrilonitrin. B. poli(etylen–terephthalat).
C. nylon–6,6. D. xenlulozơ triaxetat.

Câu 20: Cho m gam axit glutamic (HOOC-[CH₂]₂-CH(NH₂)-COOH) tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của m là

- A. 21,90 B. 43,80 C. 44,10 D. 22,05





Câu 21: Cho 0,15 mol bột Fe tác dụng với 0,15 mol Cl₂, nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

- A. 16,250 B. 19,050 C. 12,700 D. 8,125

Câu 22: Phương trình hóa học nào sau đây sai?

- A. $\text{NaHCO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
B. $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
C. $2\text{Li} + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{LiCl} + \text{H}_2$
D. $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$

Câu 23: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm khí X tác dụng với chất rắn Y, nung nóng sinh ra khí Z . Phương trình hóa học của phản ứng tạo thành khí Z là



Câu 24: Kim loại nào say đây là kim loại kiềm thổ ?



A. Na

B. Ca

C. Fe

D. Al

Câu 25: Hợp chất X có công thức phân tử $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_4$. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):



Phát biểu nào sau đây sai?


A. Số nguyên tử H trong phân tử X_3 bằng 8

B. Dung dịch X_2 hòa tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ tạo dung dịch phức chất có màu xanh lam

C. Dung dịch X_3 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng

D. Nhiệt độ nóng chảy của X_1 cao hơn X_3

Câu 26: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al_2O_3 vào nước dư, thu được dung dịch Y và 5,6 lít khí H_2 (đktc). Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào khối lượng kết tủa $\text{Al}(\text{OH})_3$ theo thể tích dung dịch HCl 1M như sau:



Giá trị của m là

- A. 47,15 B. 56,75 C. 99,00 D. 49,55

Câu 27: Cho dãy chất: tinh bột, protein, vinyl fomat, anilin, mantozo. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các chất trong dãy trên?

- A. Có 3 chất bị thủy phân trong dung dịch H_2SO_4 loãng, nóng.
B. Có 2 chất có tính lưỡng tính.
C. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc.
D. Có 1 chất làm mất màu nước brom.

Câu 28: Cho 0,1 mol bột Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H_2SO_4 đặc nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và V lít khí SO_2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là

- A. 2,24 B. 6,72 C. 3,36 D. 4,48

Câu 29: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X	Quỳ tím	Quỳ tím chuyển màu xanh
Y	Nước brom	Kết tủa màu trắng
Z	Dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$	Kết tủa Ag trắng sáng
T	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	Dung dịch có màu xanh lam

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

- A. Natri stearat, anilin, mantozo, saccarozo
- B. Natri stearat, anilin, saccarozo, mantozo
- C. Anilin, natri stearat, saccarozo, mantozo
- D. Anilin, natri stearat, mantozo, saccarozo

Câu 30: Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn), ở cực âm (catot) xảy ra

- A. sự oxi hóa cation Na^+
- B. sự oxi hóa phân tử H_2O
- C. sự khử phân tử H_2O
- D. sự khử cation Na^+

Câu 31: Thực hiện các thí nghiệm sau

- (¹) Cho kim loại K vào dung dịch HCl
- (2) Đốt bột Al trong khí Cl_2
- (3) Cho Na_2CO_3 vào dung dịch AlCl_3
- (4) Cho NaOH vào dung dịch $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$
- (5) Điện phân Al_2O_3 nóng chảy, có mặt Na_3AlF_6

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra là

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4

Câu 32: Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm phenylamoni clorua ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$), alanin ($\text{CH}_3\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$) và glyxin ($\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$) tác dụng với 300ml dung dịch H_2SO_4 nồng độ a mol/lit thu được dung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của a là

- A. 0,5
- B. 1,0
- C. 1,5
- D. 2,0

Câu 33: Hỗn hợp M gồm amino axit X (no, mạch hở, phân tử chỉ chứa 1 nhóm $-\text{COOH}$ và 1 nhóm $-\text{NH}_2$) và este Y tạo bởi X và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. Đốt cháy hoàn toàn m gam M bằng một lượng vừa đủ O_2 , thu được N_2 ; 12,32 lít CO_2 (đktc) và 11,25 gam H_2O . Giá trị của m là

- A. 14,75
- B. 12,65
- C. 11,30
- D. 12,35

Câu 34: Cho 0,2 mol bột Fe phản ứng hết với dung dịch X chứa đồng thời $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ và a mol $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ thu được dung dịch Y có khối lượng bằng khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết nước bay hơi không đáng kể). Giá trị của a là

- A. 0,02
- B. 0,15
- C. 0,10
- D. 0,05

Câu 35: Một học sinh tiến hành nghiên cứu dung dịch X đựng trong lọ không dán nhãn thì thu được kết quả sau:

- X đều có phản ứng với dung dịch NaOH và dung dịch Na_2CO_3 .
- X đều không phản ứng với dung dịch HCl và dung dịch HNO_3 .

Vậy dung dịch X là dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch AgNO_3 .

B. Dung dịch MgCl_2 .

C. Dung dịch KOH .

D. Dung dịch $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$.

Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm $\text{CH}\equiv\text{C}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{NH}_2$ và $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ cần dùng x mol O_2 (vừa đủ), chỉ thu được N_2 , H_2O và 4,48 lít khí CO_2 (đktc). Giá trị của x là

A. 1,35.

B. 0,27.

C. 0,54.

D. 0,108.

Câu 37: Hỗn hợp M gồm 4 peptit X, Y, Z, T (đều mạch hở) chỉ tạo ra từ các α -amino axit có dạng $\text{H}_2\text{NCnH}_2\text{nCOOH}$ ($n \geq 2$). Đốt cháy hoàn toàn 26,05 gam M, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ gồm CO_2 , H_2O và N_2) vào bình đựng 800ml dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 3,248 lít (đktc) một chất khí duy nhất thoát ra và thu được dung dịch E (chứa muối axit) có khối lượng giảm m gam so với khối lượng dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ban đầu. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 90

B. 88

C. 87

D. 89

Câu 38: Đun nóng 21,9 gam este đơn chức X với lượng dư dung dịch NaOH thì có tối đa 12 gam NaOH phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X trên cần dùng vừa đủ 42,56 lít O_2 (đktc). Giá trị của m là

A. 26,28.

B. 43,80.

C. 58,40.

D. 29,20.

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp X gồm FeO , Fe_3O_4 và Cu (trong đó FeO chiếm $\frac{1}{3}$ tổng số mol hỗn hợp X) trong dung dịch chứa NaNO_3 và HCl , thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối clorua và 0,896 lít NO (sản phẩm khử duy nhất của N^{+5} , đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp X trên trong dung dịch HCl thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối có tổng khối lượng 29,6 gam. Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thu được dung dịch T. Cho AgNO_3 tới dư vào T thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 196,35.

B. 160,71.

C. 180,15.

D. 111,27.

Câu 40: Cho hỗn hợp X gồm 0,12 mol CuO ; 0,1 mol Mg và 0,05 mol Al_2O_3 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol H_2SO_4 (loãng) và 0,55 mol HCl , thu được dung dịch Y và khí H_2 . Nhỏ từ từ dung dịch hỗn hợp $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,1M và NaOH 0,6M vào Y đến khi thu được khối lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 43,45.

B. 38,72.

C. 52,52.

D. 48,54.